

	Pfizer/BioNtech	Moderna	AstraZeneca	Janssen-Cilag
Vaccin	Comirnaty	COVID-19 Vaccine Moderna	Vaxzevria	COVID-19 Vaccine Janssen
Sujets inclus dans les essais cliniques	43 448 (21 744 vaccinés)	30 351 (15 185 vaccinés)	23 745 (12 021 vaccinés)	44 325 (21 895 vaccinés)
Fatigue	> 60 %	70 %	53,1 %	38,2%
Malaise			44,2 %	
Fièvre	> 10 %*	15,5 %	7,9 %	9%
Fébrilité			33,6 %	
Frissons	> 30 %	45,4 %	31,9 %	
Myalgies	> 30 %	61,5 %	44 %	33,2%
Arthralgies	> 20 %	46,4 %	26,4 %	
Nausées	Fréquentes	23 %	21,9 %	14,2%
Céphalées	> 50 %	64,7 %	52,6 %	38,9%
	*Une fréquence plus élevée de fièvre a été observée après la deuxième dose.	Les réactions indésirables locales et systémiques ont été plus fréquemment rapportées après la deuxième dose.	Les effets indésirables observés lors de la seconde dose étaient plus légers et moins fréquents.	
En règle générale, la réactogénicité diminue avec l'âge.				