

Êtes-vous devenue enceinte pendant le traitement ou dans la semaine qui a suivi la dernière dose ?



Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, ou souhaitez-vous devenir enceinte ? Vous devez alors arrêter votre traitement.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant le traitement ou dans la semaine qui suit l'arrêt du traitement. Des examens de suivi doivent être effectués.

Le fabricant du médicament a mis en place un registre grossesse (POEM, *Pregnancy Outcomes Enhanced Monitoring*). Il recueille de cette manière des informations sur la grossesse chez les patientes qui ont utilisé Ponvory peu avant et/ou pendant leur grossesse. Ils assurent également le suivi des bébés nés de ces grossesses.

Version RMA 08/2021



Ponvory (ponesimod) comprimés pelliculés

Carte-patiente spécifique à la grossesse

Informations pour les femmes susceptibles de devenir
enceintes

Gardez toujours cette carte sur vous. Montrez-la à tous les professionnels de la
santé que vous consultez.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Avant de commencer Ponvory

N'utilisez pas Ponvory si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne l'utilisez pas non plus si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n'utilisez pas de méthode de contraception efficace.

- Avant de commencer le traitement par Ponvory, un test de grossesse doit être effectué. Votre médecin doit confirmer que le résultat est négatif.
- Avant de commencer le traitement, votre médecin vous expliquera les effets nocifs possibles de ce médicament sur l'enfant à naître si vous deviez être enceinte pendant le traitement. Vous serez également informée de ce que vous pouvez faire pour minimiser ce risque. Votre médecin continuera à vous le faire remarquer pendant le traitement.
- Discutez avec votre médecin des méthodes contraceptives fiables à utiliser. Vous devez utiliser cette contraception pendant le traitement et pendant au moins 1 semaine après l'arrêt du traitement.

Tant que vous utilisez Ponvory

Pendant que vous prenez ce médicament, vous ne devez absolument pas devenir enceinte. Pendant votre traitement, vous devez de temps à autre refaire un test de grossesse.

- Vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant votre traitement et pendant au moins une semaine après la dernière dose.
- Voulez-vous essayer d'être enceinte ? Vous devez alors arrêter de prendre ce médicament au moins 1 semaine avant d'essayer. Contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère sur le risque d'effets nocifs sur l'enfant à naître. Il ou elle peut vous donner des conseils.
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, ou souhaitez-vous devenir enceinte ? Contactez alors votre médecin pour prendre rendez-vous. Le traitement doit être arrêté immédiatement. Plus loin, vous trouverez des informations sur la manière de signaler une grossesse.
- Ne pas allaiter.

Si vous avez arrêté d'utiliser Ponvory

- Avez-vous arrêté de prendre Ponvory parce que vous êtes enceinte ou que vous voulez essayer de devenir enceinte ? Vos problèmes de sclérose en plaques peuvent revenir ou s'aggraver. Vous pouvez également développer de nouveaux symptômes. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez cela après avoir arrêté ce médicament.
- Avez-vous arrêté de prendre ce médicament ? Vous devez alors attendre au moins une semaine de plus avant d'essayer de devenir enceinte. Vous devez donc poursuivre une contraception efficace pendant au moins une semaine.
- Êtes-vous devenue enceinte dans la semaine qui a suivi l'arrêt du traitement ? Prévenez immédiatement votre médecin. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de signaler votre grossesse.