

ZEPOSIA® (ozanimod)

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

PATIENTENKARTE FÜR PATIENTINNEN

Erinnerung im Zusammenhang mit Schwangerschaft gebärfähige Frauen

Bewahren Sie diese Karte immer bei sich auf und zeigen Sie sie jedem Angehörigen eines Gesundheitsberufs, den Sie aufsuchen, wenn Ihr Hausarzt nicht verfügbar ist oder wenn Sie auf Reisen sind.

schwangere oder gebärfähige Frauen



ZEPOSIA kann Ihr ungeborenes Kind schädigen, und ist daher während der Schwangerschaft kontraindiziert.

Gebärfähige Frauen sollten während der Behandlung mit ZEPOSIA und für mindestens 3 Monate nach Ende der Behandlung mit ZEPOSIA wenigstens eine hochwirksame Verhütungsmethode anwenden.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung des Arzneimittels ZEPOSIA auch aufmerksam die Packungsbeilage. Der vollständige und aktualisierte Text dieser Packungsbeilage ist verfügbar auf der Webseite www.famhp.be unter der Überschrift "PIL and SPC of a medicine".

Information für Patientinnen

Wenn ZEPOSIA® (ozanimod) während der Schwangerschaft eingenommen wird, kann es dem ungeborenen Kind schaden. Die möglichen Risiken sind der Verlust des ungeborenen Kindes und Geburtsfehler.

Sie dürfen ZEPOSIA nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie schwanger werden können und nicht mindestens eine hochwirksame Verhütungsmethode anwenden.

Wenn die Ozanimod-Behandlung zur Planung einer Schwangerschaft abgebrochen wird, sollte eine mögliche Rückkehr der Krankheitsaktivität in Betracht gezogen werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin sofort, wenn Sie die Einnahme von ZEPOSIA einstellen oder wenn sich die Symptome Ihrer Krankheit verschlechtern.

Die Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes befinden sich auf der Rückseite dieser Patientenkarte.

Für weitere Informationen zu Wirkungen und Nebenwirkungen von ZEPOSIA, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage).

✓ Bevor Sie die Behandlung mit ZEPOSIA beginnen:

- Wird Ihr Arzt Ihnen die möglichen Risiken für ein ungeborenes Kind erklären, wenn Sie während der Anwendung von ZEPOSIA schwanger werden, und Sie regelmäßig beraten wie Sie diese Risiken verringern können;
 - Müssen Sie eine hochwirksame Verhütungsmethode während der Behandlung mit ZEPOSIA und für mindestens 3 Monate nach Absetzen von ZEPOSIA anwenden;
 - Müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorweisen, der von Ihrem verschreibenden Arzt überprüft wird. Der Schwangerschaftstest muss in angemessenen Abständen wiederholt werden.
- ✓** Wenn Sie während der Behandlung schwanger werden, sollte die Behandlung mit ZEPOSIA abgebrochen werden. Ihr Arzt wird Sie über die schädlichen Auswirkungen auf ein ungeborenes Kind in Kombination mit der ZEPOSIA-Behandlung informieren, und es werden Ultraschalluntersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob Sie schwanger sind.
- ✓** Sie müssen die Einnahme von ZEPOSIA 3 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft einstellen.
- ✓** Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie schwanger werden, stillen, wenn Sie glauben, dass Sie schwanger sein könnten, oder wenn Sie planen, schwanger zu werden.

Mir wurde ZEPOSIA verschrieben:

ARZT NAME

.....

TELEFON

ADRESSE

.....

.....

