

## **ZEPOSIA® (ozanimod)**



Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

### **PATIËNTENKAART**

**Herinnering specifiek in verband met zwangerschap**

**Vrouwen die zwanger kunnen worden**

Hou deze kaart steeds bij u, en toon de kaart aan elke zorgverlener die u ziet als uw gebruikelijke arts niet beschikbaar is, of als u op reis bent.

### **Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden**



ZEPOSIA kan schadelijke effecten hebben op een ongeborn kind, en is daarom gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van ZEPOSIA en gedurende ten minste 3 maanden na het stoppen van de behandeling met ZEPOSIA.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel ZEPOSIA gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website [www.fagg.be](http://www.fagg.be), rubriek "BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel".

## Informatie voor de patiënten

Als ZEPOSIA® (ozanimod) tijdens de zwangerschap wordt ingenomen, kan het schadelijk zijn voor een ongeboren kind. De mogelijke risico's zijn het verlies van het ongeboren kind en geboortefwijkingen.

Gebruik ZEPOSIA niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger zou kunnen worden en geen effectieve anticonceptie gebruikt.

Wanneer de behandeling met ozanimod wordt stopgezet om een zwangerschap te plannen, dient rekening te worden gehouden met een mogelijke terugkeer van ziekteactiviteit. Vertel onmiddellijk aan uw arts als u stopt met het gebruik van ZEPOSIA en als de symptomen van uw ziekte verergeren.

Raadpleeg de achterkant van deze kaart voor de contactgegevens van uw voorschrijvende arts.

Voor meer informatie over de bijwerkingen, raadpleeg de patiëntenbijsluiter.

## ✓ Voordat u start met de behandeling met ZEPOSIA:

- Zal uw arts u de mogelijke risico's voor een ongeboren kind uitleggen als u zwanger wordt terwijl u ZEPOSIA gebruikt en zal hij/zij u regelmatig adviseren over hoe u de risico's kunt minimaliseren;
  - moet u een effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens het gebruik van ZEPOSIA en gedurende minstens 3 maanden na het stoppen van uw behandeling met ZEPOSIA;
  - moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd en moeten negatieve resultaten geverifieerd worden door de voorschrijvende arts. De test moet op gepaste tussentijdstippen worden herhaald.
- ✓ Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet ZEPOSIA worden stopgezet. Uw arts zal u inlichtingen geven over de schadelijke effecten op een ongeboren kind in combinatie met de behandeling met ZEPOSIA en er zullen echografieën worden gemaakt ter controle.
- ✓ U moet 3 maanden voordat u van plan bent zwanger te worden stoppen met het gebruik van ZEPOSIA.
- ✓ Informeer onmiddellijk uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft, als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden

**ZEPOSIA**  
**werd mij voorgeschreven door**

(contactgegevens van de voorschrijvende arts)

NAAM \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TELEFOON \_\_\_\_\_

ADRES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

